

## Medikamentenplan Orthopädie

Patientenname:

Datum:

geändert:

	Medikament / Wirkstoff	Dosierung	Früh	Mittag	Abend	Nacht

**Bitte bringen Sie Ihre Medikamente für die ersten Tage mit, bis es in der Station möglich ist, Ihre Medikamente zu bestellen.**

Bitte bringen Sie auch die Originalverpackung sowie Beipackzettel der Medikamente mit zum Vorgespräch.

**Bitte beachten Sie: Bei Einnahme von folgenden blutverdünnenden Medikamenten müssen Sie spätestens 10 Tage vor der Operation **nach Rücksprache mit Ihrem Hausarzt absetzen:****

Thomapyrin, Spalt, Marcumar, Colfarit, Godamed, Clopidogrel, Plavix, Brilique, Tyklid, Eliquis, Duoplavin.

**AUSNAHME:** Patienten die einen Herz-STENT implantiert bekommen haben dürfen das ASS nicht absetzen. Bitte den STENT-Ausweis mit in die Klinik nehmen!

Die Einnahme von oralen Antidiabetika, welche Metformin enthalten (z.B Biocos, Diabesin, Glucophage, Diabetase, espa-formin, Glucobon, Maliabet, Meglucon Mescorit, Metfogamma, Metform, Sioform, Thiabet u.a.) müssen 2 Tage vor dem geplanten Eingriff nach Rücksprache mit dem Hausarzt abgesetzt werden.

Teilen Sie uns bitte mit, ob bei Ihnen eine der folgenden Infektionen oder Erkrankungen vorliegen: HIV-Infektion, Hepatitis-B-Infektion, Diabetes.